

# DSM-5 Self Rated



DSM-5 Self Rated  
( DSM-5 SR )

[Terug naar de aanbodpagina](#)

## DOELGROEP

Volwassenen

## TYPE

DSM-5 screener

## AFNAMEDUUR

ca. 10 min

## OMSCHRIJVING

De DSM-5 SR is een DSM screener bestaande uit 23 vragen. Evaluatie van cliënten geschiedt op 4 gebieden: interpersoonlijke problemen, psychiatrische symptomen, maatschappelijk disfunctioneren en symptomatische stress. De DSM-5 SR is bedoeld om zorgverleners te helpen om aandachtsgebieden te identificeren waar nader onderzoek nodig is wat belangrijk kan zijn in de diagnose en behandeling van de cliënt.

## ADVIES VOOR GEBRUIK

## ANTWOORDTYPE

Meerkeuze antwoorden op een 5-punts schaal variërend van 'Helemaal niet=0' tot 'Bijna elke dag=4'.

## SCORING

## INTERPRETATIE

Bekijk de scores van de individuele items binnen elke subschaal. De score van het hoogst scorende item is leidend om te bepalen of er nader onderzoek nodig is op het betreffende gebied. Bepaal dit als volgt:

- Voor de subschalen Middelengebruik, Psychose en Suicide ideatie: follow-up bij een itemscore van 1 of hoger.
- Alle overige subschalen: follow-up bij een itemscore van 2 of hoger.

## SUBSCHALEN

De volgende subschalen worden onderscheiden:

- Depressie
- Boosheid
- Manie
- Angst
- Somatische symptomen
- Suïcide ideatie
- Psychose
- Slaapproblemen
- Geheugenproblemen
- Dwangklachten
- Dissociatie
- Persoonlijkheidsproblematiek
- Middelengebruik

## ALGEMEEN

## NORMGROEPEN

Er is een algemene normgroep beschikbaar.

## LICENTIEHOUDER

© American Psychiatric Association

© Nederlandse versie: zorgIQ

## LITERATUUR

## LICENTIEKOSTEN

Geen licentiekosten

Inhoud Inhoud

Naam DSM-5 Self Rated

Afkorting DSM-5 SR

Taal nederlands

Categorie triage, DSM-5 screening

Doelgroep Volwassenen

Type DSM-5 screener

Afnameduur ca. 10 min

**Omschrijving** De DSM-5 SR is een DSM screener bestaande uit 23 vragen. Evaluatie van cliënten geschiedt op 4 gebieden: inter-persoonlijke problemen, psychiatrische symptomen, maatschappelijk disfunctioneren en symptomatische stress. De DSM-5 SR is bedoeld om zorgverleners te helpen om aandachtsgebieden te identificeren waar nader onderzoek nodig is wat belangrijk kan zijn in de diagnose en behandeling van de cliënt.

**Antwoordtype** Meerkeuze antwoorden op een 5-punts schaal variërend van 'Helemaal niet=0' tot 'Bijna elke dag=4'.

**Interpretatie** Bekijk de scores van de individuele items binnen elke subschaal. De score van het hoogst scorende item is leidend om te bepalen of er nader onderzoek nodig is op het betreffende gebied. Bepaal dit als volgt:

- Voor de subschalen Middelengebruik, Psychose en Suicide ideatie: follow-up bij een itemscore van 1 of hoger.
- Alle overige subschalen: follow-up bij een itemscore van 2 of hoger.

Subschalen De volgende subschalen worden onderscheiden:

- Depressie
- Boosheid
- Manie
- Angst
- Somatische symptomen
- Suïcide ideatie
- Psychose
- Slaapproblemen
- Geheugenproblemen
- Dwangklachten
- Dissociatie
- Persoonlijkheidsproblematiek
- Middelengebruik

Normgroepen Er is een algemene normgroep beschikbaar.

Licentiekosten en afname Licentiekosten en afname

Tarief per afname € 1,11

Licentiekosten Geen licentiekosten

Literatuur en copyright Literatuur en copyright

Licentiehouders © American Psychiatric Association

© Nederlandse versie: zorgIQ

sourcecall ?sourcecall=2